

Rixathon® ist **NUR** zur **INTRAVENÖSEN** Anwendung vorgesehen – **NICHT** zur **SUBKUTANEN** Anwendung

Andere Rituximab-Produkte zur subkutanen Anwendung sind im Markt erhältlich.

INTRAVENÖSE INFUSION

Rixathon® 100 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rixathon® 500 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Zur intravenösen Anwendung bei allen zugelassenen Indikationen von Rixathon®

Rixathon® 100 mg

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rituximab

100 mg/10 ml

Zur intravenösen Infusion nach Verdünnung

2 Durchstechflaschen mit 10 ml

SANDOZ A Novartis Division

Rixathon® 500 mg

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Rituximab

500 mg/50 ml

Zur intravenösen Infusion nach Verdünnung

1 Durchstechflasche mit 50 ml

SANDOZ A Novartis Division

Mit 0,9%iger Kochsalzlösung oder 5%iger Glucoselösung verdünnen und als intravenöse Infusion verabreichen.

SANDOZ A Novartis Division