

Dieser Pass enthält wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit, die Ihnen bekannt sein müssen, bevor und während Sie mit Erelzi® behandelt werden. Sollten Sie zum Inhalt dieses Passes Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Zeigen Sie diesen Pass allen Ärzten, von denen Sie behandelt werden.

- **Weitere Informationen** finden Sie in der Erelzi®-Packungsbeilage.
- **Bewahren Sie diesen Pass** nach der letzten Erelzi®-Anwendung bitte **2 Monate auf**, da Nebenwirkungen auch erst einige Zeit nach Abschluss der Behandlung mit Erelzi auftreten können.

Infektionen

Erelzi® kann Ihr Risiko einer Infektion, die schwerwiegend sein kann, erhöhen.

- Sie sollten Erelzi® nicht anwenden, wenn Sie an einer Infektion erkrankt sind. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt.
- Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, die auf eine Infektion hindeuten, wie z. B. Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust oder Antriebslosigkeit, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Bei Ihnen sollte eine Untersuchung auf Tuberkulose (Tb) durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Arzt, umseitig die Termine und Ergebnisse der letzten Untersuchung auf Tb zu notieren.

.....
Test

.....
Datum

.....
Ergebnis

Bitten Sie Ihren Arzt, alle Ihre sonstigen Medikamente aufzulisten, die Ihr Risiko einer Infektion erhöhen können.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Herzschwäche (Herzinsuffizienz)

Wenn sich bei Ihnen Symptome zeigen, **die auf die Entwicklung einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) oder auf die Verschlechterung einer bestehenden Herzschwäche hindeuten**, wie z. B. Kurzatmigkeit, geschwollene Gelenke, hartnäckiger Husten oder Erschöpfung, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Weitere Informationen (bitte ausfüllen)

.....
Name des Patienten

.....
Name des Arztes

.....
Telefon-Nr. des Arztes